

۱۷۱

A

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

۱۷۱A

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه
۱۳۹۴/۱۲/۱۴

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تموکز) – سال ۱۳۹۵

دامپزشکی (کد ۲۷۰۱)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان دروس اختصاصی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	بیوشیمی ۱و۲، فیزیولوژی ۱و۲، آسیب‌شناسی عمومی	۱۰۰	۱	۱۰۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

پیو شیمی ۱ او ۲:

- ۱ بار خالص کدام اسید آمینه در pH فیزیولوژیک صفر می‌باشد؟
- (۱) آرژنین (۲) ایزو لو سین (۳) لیزین (۴) گلو تامات
- ۲ در واکنش اکسیدا سیون قندها اگر تنها عامل الکلی نوع اول اکسید شود ترکیب حاصل را چه می‌نامند؟
- (۱) اسید ال دونیک (۲) اسید ال داریک (۳) اسید ارونیک (۴) اسید سا کاریک
- ۳ کدام یک به اسم قند معکوس است؟
- (۱) سا کارز (۲) لاکتوز (۳) گلو کز (۴) مانوز
- ۴ کمبود کبات در بدن، کدام یک از مسیرهای متابولیسمی زیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
- (۱) اکسیدا سیون اسیدهای چرب فرد کربن (۲) تجزیه پورینها (۳) سنتز پالمتیات (۴) سیکل کربس
- ۵ در شرایط نیاز به انرژی، گلیکوژن کدام یک از بافت‌های زیر می‌تواند تأمین‌کننده نیاز سایر سلول‌های بدن باشد؟
- (۱) گبد (۲) عضله (۳) کلیه (۴) موارد ۱ و ۳
- ۶ همه موارد زیر درباره متابولیسم اسیدهای آمینه صحیح هستند، به غیر از:
- (۱) آلانین، فرم اصلی انتقال آمونیاک از ماهیچه‌ها به کبد است.
(۲) پیرووات، α -کتو اسید معادل آلانین می‌باشد.
- ۷ غلظت بالای آمونیاک باعث کاهش α -ستو گلو تارات در سیکل کربس مغز شده که منجر به کاهش توانایی آن در تولید ATP می‌گردد.
- ۸ کربوامیل فسفات درون سیتوسل با L-ornithine ترکیب شده و وارد چرخه اوره می‌شود.
- همه گزینه‌های زیر درباره کمپلکس ATP synthase صحیح هستند، به غیر از:
- (۱) انتقال پروتون (H^+) از خلال این کمپلکس در جهت شیب غلظت است.
(۲) در غشاء داخلی میتوکندری قرار دارد.
(۳) زیر واحدهای α و β در سمت بین غشایی قرار دارند.
(۴) می‌تواند فعالیت ATPase نیز داشته باشد.
- ۹ کدام گزینه در مورد گلیکو پروتئین‌ها صحیح است؟
- (۱) بخش کربوهیدراتی آن‌ها فقط از طریق پیوند N- گلیکوزیدی اتصال دارد.
(۲) بخش کربوهیدراتی آن‌ها به طور کوالان به پروتئین متصل است.
(۳) بخش کربوهیدراتی آن‌ها در غشای پلاسمایی در سمت سیتوزولیک می‌باشد.
(۴) در سلول‌ها و نه در پلاسمما یافت می‌شوند.
- ۱۰ کدام یک قادر کربن نامتنقارن است؟
- (۱) اسید لاکتیک (۲) سرین (۳) ریبو لوز (۴) دی‌هیدرو کسی استن
- کدام یک از ترکیبات زیر در اثر اکسیدا سیون کامل، مقدار ATP بیشتری تولید می‌کند؟
- (۱) پالمیتیک اسید (۲) فروکتوز (۳) گلو کز (۴) میریستیک اسید
- ۱۱ کدام مولکول نشانه سیری سلول و فعال کننده بیوسنتز اسید چرب می‌باشد؟
- (۱) استیل CoA (۲) اگزالو سیتیک اسید (۳) سیترات (۴) گلو کز

-۱۲

تمامی موارد زیر درباره تشکیل پیوند دی‌سولفیدی صحیح می‌باشد، بهغیراز:

- (۱) تشکیل پیوند دی‌سولفیدی خودبه‌خودی است و نیاز به آنزیم ندارد.
- (۲) تشکیل پیوند دی‌سولفیدی یک واکنش احیا شدن می‌باشد.
- (۳) در پروتئین‌های ترشحی و خارج سلولی رخ می‌دهد.
- (۴) بدلیل محیط احیایی سیتوزولی در پروتئین‌های سیتوزولی امکان‌بذیر نیست.

-۱۳

کدام ترکیب تأمین‌کننده اتم‌های نیتروژن برای سنتز پورین‌ها و پیرامیدین‌ها هستند؟

- (۱) آسپارتیک اسید
- (۲) ترا‌هیدروفولات
- (۳) کرباموئیل فسفات
- (۴) گلوتامین

-۱۴

همه اسید‌آmine‌های زیر توسط آنزیم‌های ترانس آمیناز، دامینه می‌شوند، بهغیراز:

- (۱) آسپارتات
- (۲) ترئونین
- (۳) لوسین
- (۴) گلیسین



-۱۵

کدام‌یک از آنزیم‌های گلیکوپلیزی، یک واکنش یکطرفه را کاتالیز می‌کند؟

- (۱) انولاز
- (۲) پیرووات کیناز
- (۳) سففوگلوكوبیزومراز
- (۴) گلیسر آلدیدفسفات دهیدروژناز

-۱۶

کدام گزینه توالی انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون میتوکندریایی را به درستی نشان می‌دهد؟ (ممکن است بعضی حلقه‌ها ذکر شود)



-۱۷

اثرمهاری مونوکسیدکربن بر زنجیره تنفسی میتوکندریایی، چگونه اعمال می‌شود؟

- (۱) با مهار سیتوکروم اکسیداز

- (۲) با مهار انتقال الکترون از سیتوکروم b به سیتوکروم C₁

- (۳) با مهار انتقال از مراکز آهن - گوگرد به یووی کینون

- (۴) با بر هم زدن شبیب پروتون در دو طرف غشاء داخلی میتوکندي

-۱۸

نقص ژنتیکی در کدام‌یک از آنزیم‌های زیر باعث بروز بیماری آکاپتونوری می‌شود؟

- (۱) تیروزین آمینو ترانسفراز

- (۲) فنیل آلانین هیدروکسیلاز

- (۳) هموژنیترات اکسیداز

-۱۹

در همه موارد زیر، اکسیداسیون اسیدهای چرب، اتفاق می‌افتد، بهغیراز:

- (۱) سلول‌های روده‌ای
- (۲) سلول‌های عضلاتی
- (۳) گلبول‌های قرمز
- (۴) سلول‌های مغزی

-۲۰

با اکسیداسیون کربن شماره ۱ گلوکز، کدام ترکیب حاصل می‌شود؟

- (۱) گلونیک اسید
- (۲) گلورونیک اسید
- (۳) گلوکورونیک اسید
- (۴) گلوکونیک اسید

-۲۱

در مهار آنزیم کیموتراپسین با دی‌ایزو پروپیل فلورو فسفات (DIFP)، این مهارکننده جز کدام دسته است؟

- (۱) مهارکننده‌های برگشت‌ناپذیر

- (۲) مهارکننده‌های برگشت‌پذیر

- (۳) مهارکننده‌های متکی به مکانیسم

- ۲۲- انترون چیست؟

(۱) یک نوع tRNA است.

(۲) خودش یک نوع پروتئین است.

(۳) نواحی از DNA است که برای پروتئین‌ها کد می‌شوند.

(۴) نواحی از DNA است که برای پروتئین‌ها کد نمی‌شوند.

- ۲۳- تبدیل نور اپی نفرین به اپی نفرین همراه با کدام یک از واکنش‌های زیر است؟

(۱) ترانس آمیناسیون (۲) کربوکسیلاسیون (۳) متیلاسیون

- ۲۴- بیماری فاویسم مربوط به نقص در سطح کدام آنزیم است؟

(۱) Phosphofructo kinase1

(۲) Glucose6 – phosphate dehydrogenase

(۳) Phosphofructo kinase2

(۴) Glucose6 – phosphatase

- ۲۵- تنظیم طولانی مدت فعالیت آنزیمی، برخلاف تغییرات سریع و لحظه‌ای، توسط کدام مکانیسم صورت می‌گیرد؟

(۱) اصلاح شیمیایی (Chomical modilcation) آنزیم

(۲) تنظیم آلosterیک آنزیم

(۳) سنتز یا تجزیه آنزیم

(۴) مهار آنزیم

- ۲۶- به ترتیب، بیماری‌های آلکاپتونوریا، آپینیسم و MSUD (ادرار شربت افرا) ناشی از نقص در متابولیسم کدام اسیدهای آمینه است؟

(۱) آلانین، تیروزین، اسیدهای آمینه شاخه‌دار

(۲) فنیل آلانین، تیروزین، اسیدهای آمینه شاخه‌دار

(۳) فنیل آلانین، آلانین، تیروزین، گلوتامات

- ۲۷- همه عبارات زیر در مورد اسیدآمینه صحیح هستند، به غیر از:

(۱) یک اسیدآمینه در pH خنثی به صورت یک مولکول دوقطبی عمل می‌کند.

(۲) تریپتوفان، فنیل آلانین و تیروزین جز اسیدآمینه‌های حلقوی هستند.

(۳) گلایسین کوچک‌ترین اسیدآمینه است که گروه جانبی آن فقط از یک H تشکیل شده است.

(۴) میتونین، سستین و هیستیدین جز اسیدآمینه‌های گوگرددار هستند.

- ۲۸- سیکل اوره پستانداران در کدام ناحیه از سلول‌های کبدی صورت می‌گیرد؟

(۱) سیتوپلاسم (۲) میتوکندری (۳) هسته

(۴) موارد ۱ و ۲

- ۲۹- کدام یک از قندهای زیر غیر احیاکننده است؟

(۱) تره‌هالوز (۲) لاکتوز (۳) مالتوز

(۴) گلوكز

- ۳۰- نام دیگر پروتئین DnaB چیست؟

(۱) پریماز (۲) جیراز (۳) DNA لیگاز

(۴) DNA هلیکاز

- ۳۱- در مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب، عامل تک کربنه موردنیاز برای تبدیل استیل کوا به مالونیل کوا از کدام مورد تأمین می‌شود؟

(۱) بیوتین (۲) تراهیدروفولات (۳) کوبالامین

(۴) گلایسین

- ۳۲ - همه گزینه‌ها در مورد آنزیمه‌ها صحیح هستند، به‌غیراز:

- (۱) ابرژی فعال‌سازی واکنش را کاهش می‌دهند. (۲) تغییری در ثابت تعادل واکنش ایجاد نمی‌کنند.
 (۳) سرعت واکنش را در یک جهت افزایش می‌دهند. (۴) ΔG واکنش را تغییر نمی‌دهند.

- ۳۳ - اسیدوز متابولیکی چه تأثیری روی خواص هموگلوبین بر جا می‌گذارد؟

- (۱) تمایل هموگلوبین برای جذب اکسیژن افزایش می‌باید.
 (۲) تمایل هموگلوبین برای جذب اکسیژن کاهش می‌باید.
 (۳) مقدار جذب اکسیژن توسط سلول از هموگلوبین کاهش می‌باید.
 (۴) تأثیری ندارد.

فیزیولوژی ۱۰۲:

- ۳۴ - بیشترین مقاومت در برابر جریان هوا در کدام قسمت ریه ایجاد می‌شود؟

- (۱) برونژ (۲) پرونژیولها (۳) مجاری آلوئولی (۴) نای

- ۳۵ - کار سلول‌های مزانشیال گلومرولی در کلیه‌ها چیست؟

- (۱) باز جذب مواد (۲) ترشح رنین (۳) تغییر GFR (۴) ترشح آنتی‌بادی

- ۳۶ - کدام‌یک در میان تمامی گونه‌های حیوانی تنها جزء ثابت پلاسمای منی است؟

- (۱) اسید لاکتیک (۲) اسید اسکوربیک (۳) فروکوتوز (۴) گلوكز

- ۳۷ - کدام‌یک از هورمون‌های زیر موجب تحریک ترشح انسولین می‌شود؟

- (۱) پلی پپتید مهاری معده (GIP) (۲) گاسترین (۳) موتیلین (۴) گوله سیستوکینین

- ۳۸ - منشأ اصلی گلوكز خون نشخوارکننده چیست؟

- (۱) استات (۲) بوتیرات (۳) پروپیونات (۴) لاکتان

- ۳۹ - ترشح اسید معده توسط کدام‌یک تحریک می‌گردد؟

- (۱) استیل کولین، گوله سیستوکینین (۲) سکرتین، گاسترین (۳) سکرتین، هیستامین (۴) استیل کولین، گاسترین

- ۴۰ - همه موارد زیر تخلیه معده را کاهش می‌دهند، به‌غیراز:

- (۱) حضور نشاسته در دوازده
 (۲) حضور مایع هیپرتونیک در دوازده
 (۳) حضور مایع با pH کمتر از ۳/۵ در دوازده (۴) حضور اسید چرب یا مونوگلیسیرید در دوازده

- ۴۱ - مهم‌ترین عامل تحریک آسینی‌های پانکراس کدام است؟

- (۱) VIP (۲) استیل کولین (۳) سکرتین (۴) گوله سیستوکینین

- ۴۲ - مهار گیرنده‌های کدام نوروترانسمیتر باعث مهار مرکز استفراغ می‌شود؟

- (۱) استیل کولین (۲) دوپامین (۳) سروتونین (۴) نوراپی‌نفرین

- ۴۳ - در کدام‌یک از مراحل تغذیه‌ای غلظت هورمون گوله سیستوکینین (CCK) در پلاسما افزایش می‌باید؟

- (۱) مرحله سفالیک (۲) مرحله دهانی (۳) مرحله روده‌ای (۴) مرحله گاستریک

- ۴۴ در صورت قطع اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در قلبی که به طور طبیعی کار می‌کند، چه پدیده‌ای رخ خواهد داد؟
- (۱) کاهش ضربان قلب
 - (۲) افزایش ضربان قلب
 - (۳) عدم تغییر در تعداد و قدرت ضربان قلب
 - (۴) افزایش قابل توجه قدرت انقباضی قلب
- ۴۵ فشار خون سیستولی و دیاستولی در گردش خون ریوی چند میلی متر جیوه است؟
- (۱) ۱۵ و ۲۵
 - (۲) ۸ و ۲۵
 - (۳) ۱۰۰ و ۱۵
 - (۴) ۱۲۰ و ۸۰
- ۴۶ اطلاعات حسی که باید با سرعت و کیفیت دقیق تری هدایت شوند از طریق کدام مسیر ارسال می‌گردند؟
- (۱) ستون خلفی - نوار میانی
 - (۲) نخاعی - تalamوسی قدامی
 - (۳) نخاعی - مخچه‌ای قدامی
 - (۴) نخاعی - تalamوسی جانبی
- ۴۷ چرا فشار اکسیژن در سرخرگ آنورت کمتر از حد انتظار است؟
- (۱) بهدلیل ورود خون تهویه نشده به سیاهرگ ریوی
 - (۲) بهدلیل ورود خون تهویه نشده به سرخرگ ریوی
 - (۳) وجود shunt در آنورت
 - (۴) وجود shunt در عروق کبدی
- ۴۸ در طول کدام مرحله از پتانسیل عمل طبیعی بطن، بیشتر احتمال دارد کانال‌های سریع سدیمی غیرفعال، کانال‌های کلسیمی آهسته باز و بیشتر کانال‌های پتانسیمی بسته باشند؟
- (۱) مرحله صفر (دیپولاریزاسیون سریع)
 - (۲) مرحله یک (ریپولاریزاسیون جزئی)
 - (۳) مرحله سه (ریپولاریزاسیون کامل)
 - (۴) مرحله دو (کفه)
- ۴۹ همه موارد زیر موجب افزایش فشار نبض می‌شوند، به غیر از افزایش:
- (۱) حجم ضربه‌ای
 - (۲) ضربان قلب
 - (۳) مقاومت کل محیطی
 - (۴) کومپلیانس شریانی
- ۵۰ در مورد اثر Bohr (بور) کدام یک صحیح است؟
- (۱) کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام افزایش pH خون
 - (۲) کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام کاهش pH خون
 - (۳) افزایش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام کاهش pH خون
 - (۴) افزایش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام افزایش pH خون
- ۵۱ کدام یک از ضایعات مغزی و نخاعی موجب اختلال در عمل تنفس می‌گردد؟
- (۱) ضایعه تalamوس
 - (۲) قطع نخاع کمری
 - (۳) قطع نخاع گردی
 - (۴) ضایعه قشر مغز
- ۵۲ همه عبارت‌های زیر در مورد دوپامین صحیح می‌باشند، به غیر از:
- (۱) یکی از اعمال اصلی دوپامین در مغز تحریک ترشح پرولاکتین می‌باشد.
 - (۲) یکی از عوارض کمبود دوپامین در مغز بیماری پارکینسون می‌باشد.
 - (۳) محل تجمع جسم سلولی نورون‌های دوپامینرژیک در مغز جسم سیاه می‌باشد.
 - (۴) کاتابولیسم دوپامین توسط آنزیم‌های MAO و COMT انجام می‌شود.
- ۵۳ در فرآیند انتقال پیام سلولی، پروتئین Gq کدام آنزیم را فعال می‌کند؟
- (۱) آدنیل سیکلаз
 - (۲) فسفولیپاز C
 - (۳) فسفولیپاز D
 - (۴) گوانیل سیکلاز
- ۵۴ آنزیم‌های اصلی دخیل در فرآیند آپوپتوز کدام‌اند؟
- (۱) اندونوکلتازها
 - (۲) اگزونوکلتازها
 - (۳) کاسپیزها
 - (۴) لیپوپروتئین لیپازها

- ۵۵- کلسیم در همه فرایندهای زیر ضروری است، بهغیراز:

- (۱) انعقاد خون
- (۲) ایجاد پاسخ سلولی هورمون‌های پروتئینی
- (۳) ایجاد پاسخ سلولی هورمون‌های استروئیدی
- (۴) شروع (trigger) انقباض عضله قلبی

- ۵۶- در طی یک پتانسیل پس سیناپسی تحریکی (EPSP) در غشاء نورون، کدام مورد مهم‌ترین جریان یونی است؟

- (۱) یون‌های پتانسیل بهوسیله پمپ سدیم - پتانسیم به داخل پمپ می‌شود.
- (۲) یون‌های پتانسیم به خارج از نورون انتشار می‌یابد.
- (۳) یون‌های سدیم به خارج از نورون انتشار می‌یابد.
- (۴) یون‌های سدیم به داخل نورون انتشار می‌یابد.

- ۵۷- تأثیر غالب سیستم عصبی سمپاتیک بر روی عضله صاف عروق خونی عضلات اسکلتی از طریق کدام گیرنده میانجیگری می‌شود؟

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| α_2 (۴) | α_1 (۳) | β_2 (۲) | β_1 (۱) |
|----------------|----------------|---------------|---------------|

- ۵۸- عمل استیل کولین روی غشای پس سیناپسی در محل اتصال عصب - عضله، باز کردن کانال‌های دریچه‌دار می‌باشد.

- (۱) سدیمی وابسته به لیگاند
- (۲) سدیمی وابسته به ولتاژ
- (۳) پتانسیمی وابسته به ولتاژ
- (۴) کلری وابسته به لیگاند

- ۵۹- کدام یک از گیرنده‌های مربوط به سیستم نورآدرنرژیک به صورت پیش سیناپسی است؟

- (۱) آلفا دو
- (۲) آلفا یک
- (۳) بتا دو
- (۴) بتا یک

- ۶۰- همه هورمون‌های زیر به پروتئین‌های پلاسمایاند می‌شوند، بهغیراز:

- (۱) تیروکسین
- (۲) پروژسترون
- (۳) کورتیزول
- (۴) وازوپرسین

- ۶۱- در مورد اثرات انسولین کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) لیپوزن را تشديد می‌کند.
- (۲) لیپوزن را مهار می‌کند.
- (۳) گلیکوزنولیز را تشديد می‌کند.
- (۴) گلیکوزنر را تشديد می‌کند.

- ۶۲- تجویز آندروژن خارجی به بدن سبب کدام می‌شود؟

- (۱) افزایش تولید اسپرم
- (۲) افزایش LH خون
- (۳) کاهش آندروژن خون
- (۴) کاهش آندروژن در لوله‌های اسپرم‌ساز

- ۶۳- عامل اصلی که در زمان گرسنگی مستقیماً سبب تحریک ترشح گلوکاغن می‌شود کدام است؟

- (۱) تحریک اعصاب کلی نرژیک
- (۲) سطح پایین انسولین
- (۳) سطح پایین گلوكز خون
- (۴) سطح پایین اسیدهای چرب آزاد

- ۶۴- در مدل استروئیدوژن دو سلول تخدمان، سلول‌های تکابتدای کدام را تولید می‌کنند؟

- (۱) آندروستنديون
- (۲) استراديل
- (۳) پروژسترون
- (۴) تستوسترون

- ۶۵- دلیل افزایش تعداد تنفس در بیماری انسدادی مزمن ریوی چیست؟

- (۱) افزایش فضای مرده آناتومیکی
- (۲) کاهش فضای مرده آناتومیکی
- (۳) کاهش مقاومت مجاري ریوی
- (۴) افزایش مقاومت مجاري ریوی

- ۶۶- تنظیم فیلتراسیون گلومرولی توسط همه موارد زیر انجام می‌شود، بهغیراز:

- (۱) نوراپی نفرین
- (۲) فیدبک توبولی گلومرولی

ANP (۴)

آسیب‌شناسی عمومی:

- ۶۷- نفوذ جسم فلزی تیز و بلند در دیواره نگاری نشخوار کنندگان، در مراحل اولیه چه نوع آماسی را ایجاد می‌نماید؟

Fibrinous Reticulitis (۲)

Fibrinous Typhlitis (۴)

Fibrinous Pericarditis (۱)

Fibrinous Rumenitis (۳)

- ۶۸- در کدام یک، ممکن است نکروز آبکی ایجاد شود؟

(۱) آماس چركی (۲) آماس فیبرینوئید (۳) آماس سروزی (۴) آماس فیبرینی

- ۶۹- کدام ضایعه بافتی غیرقابل برگشت محسوب می‌شود و دیگر قابل درمان نیست؟

(۱) ادم ربوی (۲) خونریزی کانونی ربوی (۳) فیبروز ربوی (۴) پنومونی فیبرینی چركی

- ۷۰- در بیماری‌های اکتینومیکوز، اکتینوباسیلوز، کدام نوع آماس ایجاد می‌شود؟

(۱) پیوگرانولوماتوز (۲) فیبرینی (۳) فیبرینوئید (۴) سروزی چركی

- ۷۱- همه اصطلاحات ذیل در خصوص سازش پذیری سلولی صحیح است، به غیر از:

(۱) هیپرپلازی سلول‌های گلیال مغز (۲) هیپرتروفی سلول‌های پورکر مخچه (۳) هیپرپلازی سلول‌های عضلانی صاف روده (۴) هیپرپلازی سلول‌های عضلانی مخطط قلب

- ۷۲- در کالبدگشایی یک پرنده بیمار، مواد گچی‌شکل و سفیدرنگ روی اپیکارد قلب، سطوح مزانتر، کبد و داخل کلیه‌ها مشاهده شد، محتمل‌ترین عامل این یافته‌ها کدام است؟

(۱) آهکی‌شدن (۲) لیپیدوزیس (۳) گانگرن سطحی (۴) نفرس

- ۷۳- سلول‌های نارسایی قلبی (Heart failure cells)، به علت تجمع کدام ماده در سیتوپلاسم و در کدام سلول ایجاد می‌شوند؟

(۱) لیپوفوشین - سلول‌های عضلانی قلب (۲) هموسیدرین - سلول‌های عضلانی قلب

- ۷۴- به متراکم شدن کروماتین هسته در سلول نکروزه چه می‌گویند؟

(۱) Karyolysis (۴) Karyorrhexis (۳) Pyknosis (۲) Chromatolysis (۱)

- ۷۵- کدام مورد در ایجاد تپ دخالت دارد؟

(۱) Bradykinin (۴) IL - ۶ (۳) LTB (۲) IL - ۸ (۱)

- ۷۶- کدام یک از موارد زیر در آسیب ایسکمیک سلول، بیانگر تغییر غیرقابل برگشت می‌باشد؟

(۱) افزایش گلیکولیز (۲) تغییرات اسکلت سلولی

- ۷۷- مهم‌ترین عامل فراخوانی نوتروفیل‌ها به محل وقوع آماس حاد بافتی، کدام است؟

(۱) LTB (۴) PDGF (۳) PGI (۲) TNF (۱)

- ۷۸- کدام مورد جزو کاسپازهای آغازگر (Initiator caspases) می‌باشد؟

(۱) Caspase 9 (۴) Caspase 6 (۳) Caspase 4 (۲) Caspase 3 (۱)

- ۷۹- کمبود ویتامین A باعث کدام یک از تغییرات پاتولوژیک در سلول‌های پوششی دستگاه گوارش پرندگان می‌شود؟

(۱) آتروفی (۲) متاپلازی (۳) هیپرپلازی (۴) هیپرتروفی

- ۸۰- اجسام راسل Russell bodies نشان‌دهنده تجمع کدام یک در سلول است؟

(۱) چربی (۲) کریستالوئید (۳) گلیکوژن (۴) هیالن

- ۸۱ کدام یک اثر پیش انعقادی **Procoagulant** دارد؟
- Tissue plasminogen activator (۲) plasminogen activator inhibitor (۱)
 (۳) نیتریک اکساید (NO)
 (۴) هپاران سولفات
- ۸۲ سوختگی‌ها و آسیت، معمولاً باعث ایجاد کدام نوع شوک می‌گردد؟
- (۱) سپتیک (۲) کاردیوژنیک (۳) نوروزنیک
 (۴) هیپوولمیک
- ۸۳ ساختمان بافت جوانه گوشتی در اولین مراحل تشکیل، چگونه است؟
- (۱) بافتی پرعروق، کم رشته و پرسلول (۲) بافتی پرعروق، پررشته و پرسلول
 (۳) بافتی کم عروق، پررشته و کم سلول (۴) بافتی کم عروق، کم رشته و کم سلول
- ۸۴ نارسایی قلب راست معمولاً با کدام مکانیسم باعث ایجاد ادم می‌شود؟
- (۱) افزایش نفوذپذیری جدار عروق (۲) انسداد عروق لنفاوی و احتباس سدیم
 (۳) افزایش فشار هیدروستاتیک (۴) کاهش فشار اسمتیک - کلولئیدی
- ۸۵ کدام سلول در روند ایجاد ترمیم و التیام زخم نقش کمتری دارد؟
- (۱) آنزیوبلاست (۲) فیبروبلاست (۳) ماکروفاز (۴) نوتروفیل
- ۸۶ بافتی که آسیب دیده و پس از آن روند فیبروز را طی می‌کند، معمولاً ممکن است به چه سرنوشتی دچار گردد؟
- (۱) آتروفی (۲) دیسپلазی (۳) هیپرتروفی (۴) نتوپلازی
- ۸۷ اشعه مأواه‌بنفس، با کدام مکانیسم در ایجاد تومور نقش دارد؟
- (۱) ایجاد دیمرهای پیریمیدین (۲) جایه‌جایی کروموزومی (۳) شکست کروموزومی
 (۴) چesh نقطه‌ای
- ۸۸ تومور بدخیم لایه عضلانی رحم سگ را چه می‌نامند؟
- (۱) کندروسارکوم (۲) رابdomیوسارکوم (۳) لیومیوسارکوم (۴) کندروسارکوم
- ۸۹ در برداشت رادیکال آزاد سمتی اکسیژن، تمام موارد زیر نقش دارند، به غیراز:
- (۱) آنزیم P₄₅₀ اکسیداز (۲) کاتالاز (۳) سوبر اکسید دیسموتاز (SOD)
 (۴) گلوتاتیون پراکسیداز
- ۹۰ نوع پروتئین آمیلوئیدی که به دنبال بیماری سل گاوی ممکن است در عروق کبد و کلیه و سایر بافت‌های بدن رسب نماید از چه نوعی است؟
- (۱) AL (۲) AA (۳) TTR
 (۴) بتا دو میکرو گلوبولین_m
- ۹۱ تمام موارد زیر از مختصات میکروسکوپیک یک تومور بدخیم محسوب می‌گردد، به غیراز:
- (۱) آنالازی زیاد (۲) پلنومورفیسم زیاد (۳) تفکیک و تمایز زیاد (۴) دگرگونی زیاد
- ۹۲ کدام واسطه شیمیایی باعث تجمع اتوژنوفیل‌ها در موضع آماسی می‌گردد؟
- (۱) EGF (۲) ECF (۳) HGF (۴) FGF
- ۹۳ نحوه یا الگوی رشد سلول‌های سرطانی در زیر میکروسکوپ در کدام یک از تومورها به صورت صفحه سلولی می‌باشد؟
- (۱) پاپیلوم (۲) لنفوم (۴) تومور سلول‌های سرتولی بیضه
- (۳) فیبروسارکوم

- ۹۴- بنیان گذار پاتولوژی نوین و توجه به واحد سلولی به عنوان علت به وجود آمدن تغییرات کارکردی و ساختمانی در طی بیماری، کیست؟
- Rudolf Virchow (۲) Jozsef Marek (۱)
Friedrich Zenker (۴) Augustus Waller (۳)
- ۹۵- خامات مقاطع بافتی که به طور معمول پس از رنگ‌آمیزی به روش H & E و با میکروسکوب نوری در آزمایشگاه پاتولوژی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، چند میکرومتر (میکرومتر) است؟
- ۱۵ (۴) ۱۰ (۳) ۵ (۲) ۱ (۱)
- ۹۶- به دنبال افزایش میزان گلوكورتیکوئیدها در بدن کدام حیوان، ممکن است عارضه Calcinosis cutis به وجود آید؟
- (۱) اسب (۲) سگ (۳) طیور (۴) گوسفند
- ۹۷- عفونت با کدامیک از عوامل ویروسی باعث ایجاد عارضه هیپوپلازی مینا در دندان‌های دائمی خواهد شد؟
- (۱) ویروس بیماری طاعون گاوی (۲) ویروس بیماری مرزی در گوسفند (۳) ویروس بیماری پان لکوپنی در گربه
- ۹۸- عاقب ناشی از ادم، در تمامی موارد ذکر شده در ذیل، مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند باعث مرگ گردد، به‌غیراز:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Hydropericardium (۲) | Cerebral edema (۱) |
| Pulmonary edema (۴) | Subcutaneouse edema (۳) |
- تمامی موارد زیر باعث ایجاد Cast (سیلندر) می‌گردد، به‌غیراز:
- | | | | |
|-----------------|------------|----------|-------------|
| Hemosiderin (۴) | Fibrin (۳) | Bile (۲) | Albumin (۱) |
|-----------------|------------|----------|-------------|
- ۹۹- حالت Acute cell swelling ایجاد شده در سلول‌های عصبی را چه می‌نامند؟
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Hydrostatic Edema (۲) | Cytotoxic Edema (۱) |
| Vasogenic Edema (۴) | Osmotic Edema (۳) |

سپاهان

سپاهان